



QUEL EXAMEN D'IMAGERIE POUR LA LOMBALGIE COMMUNE ?

DEUX CAS POSSIBLES :

1 PAS D'EXAMEN POUR :

Lombalgies
et lombosciatalgies communes
dans les 7 premières semaines



2 POSSIBILITÉ D'EXAMEN D'IMAGERIE SI :



SOUS TRAITEMENT :

- Absence d'évolution favorable sous traitement symptomatique
- Élimination formelle d'une lombalgie spécifique avant manipulation ou infiltration

URGENCES :

- Sciatique hyperalgique rebelle aux opiacés
- Sciatique paralysante (déficit moteur < 3 échelle MRC ou progressif)
- Syndrome de la queue de cheval

LOMBALGIES ET LOMBOSCIATIQUES SPÉCIFIQUES :

FRACTURE

- Traumatisme important récent
- Corticothérapie prolongée
- Âge > 70 ans

NÉOPLASIE

- Âge > 50 ans
- Altération état général, perte de poids inexpliquée
- ATCD tumoral

INFECTION

- Fièvre
- Douleurs au repos, d'aggravation progressive à recrudescence nocturne
- Infection urinaire
- Immunodépression
- Drogues IV

Références :

HAS

- https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272083/fr/prise-en-charge-diagnostique-et-therapeutique-des-lombalgies-et-lombosciatiques-communes-de-moins-de-trois-mois-d-evolution
- <https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lombreco.pdf>

Guide du bon usage :

- <http://gbu.radiologie.fr>