



# QUEL EXAMEN D'IMAGERIE POUR LA LOMBALGIE COMMUNE ?

DEUX CAS POSSIBLES :

## 1 PAS D'EXAMEN POUR :

Lombalgies  
et lombosciatalgies communes  
dans les 7 premières semaines



## 2 POSSIBILITÉ D'EXAMEN D'IMAGERIE SI :



### SOUS TRAITEMENT :

- Absence d'évolution favorable sous traitement symptomatique
- Élimination formelle d'une lombalgie spécifique avant manipulation ou infiltration

### URGENCES :

- Sciaticque hyperalgique rebelle aux opiacés
- Sciaticque paralysante (déficit moteur < 3 échelle MRC ou progressif)
- Syndrome de la queue de cheval

### LOMBALGIES ET LOMBOSCIATIQUES SPÉCIFIQUES :

#### FRACTURE

- Traumatisme important récent
- Corticothérapie prolongée
- Âge > 70 ans

#### NÉOPLASIE

- Âge > 50 ans
- Altération état général, perte de poids inexpliquée
- ATCD tumoral

#### INFECTION

- Fièvre
- Douleurs au repos, d'aggravation progressive à recrudescence nocturne
- Infection urinaire
- Immunodépression
- Drogues IV

### Références :

HAS

- [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_272083/fr/prise-en-charge-diagnostique-et-therapeutique-des-lombalgies-et-lombosciatiques-communes-de-moins-de-trois-mois-d-evolution](https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272083/fr/prise-en-charge-diagnostique-et-therapeutique-des-lombalgies-et-lombosciatiques-communes-de-moins-de-trois-mois-d-evolution)
- <https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lombreco.pdf>

Guide du bon usage :

- <http://gbu.radiologie.fr>